

# أسباب الإجهاض في المراحل الأولى من الحمل

يحدث الإجهاض أو فقدان الحمل في غضون الأسابيع الاثني عشر الأولى من الحمل. وهناك عوامل عدة تؤدي الى حصول هذا الأمر، ذكر منها:

- إصابة خلايا الدم الحمراء للجنين بعيوب وخلل كما في حالة التلاسيميا.
- تشوّه الكروموزومات والصبغات الوراثية للجنين، بمعنى آخر احتواء كل خلية من خلايا الجنين على كروموزم إضافي أو افتقادها كروموزوماً واحداً.
- إصابة الجنين بتشوهات هيكلية، أي خلل وعيوب في دماغه أو قلبه أو عاموده الفقري أو أمعائه أو كليتيه.
- إصابة الأم بالداء بالبطني أو السيلياك، وهو نوع من أنواع الالتهابات الذي يُصيب الأمعاء الدقيقة جراء ردّ فعلٍ غير طبيعي إزاء بروتين الغلوتين الموجود بكثرة في العديد من الحبوب، ويؤثر في عملية الاستقلاب ويحول دون امتصاص الجسم لعددٍ من المغذيات.
- فشل المشيمة بالانغراس بالشكل الصحيح في جدار رحم الأم نتيجة انخفاض معدل البروجيستيرون في جسم هذه الأخيرة.
- تعرّض المشيمة لنزيفٍ حاد أو تدني مستوى هرمون اتش سي جي في جسم المرأة الحامل.
- عدم انتظام معدل السكري في جسم الأم وعدم اتباعها نظاماً غذائياً صحياً ومغذياً.
- إهمال الأم نظامها الغذائي واستمرارها في بعض العادات السيئة كشرب السجائر واستهلاك مادة الكافيين بكميات كبيرة.
- وجود تكوين ليفي داخل عضلة رحم الأم أو إصابة رحم الأم وحوضها بتشوهات غالباً ما تكون نتيجة عمليات جراحية خضعت لها إثر نزيف حاد ألمّ بها في مرحلة ما بعد الولادة الأولى.