

أسباب الإجهاض في المراحل الأولى من الحمل

يحدث الإجهاض أو فقدان الحمل في غضون الأسابيع الـ ١٢ الأولى من الحمل. وهناك عوامل عدة تؤدي إلى حصول هذا الأمر، ذكر منها:

- إصابة خلايا الدم الحمراء للجنين بعيوب وخلل كما في حالة التلاسيمية.
- تشوّه الكرموزومات والصبغات الوراثية للجنين، بمعنى آخر احتواء كل خلية من خلايا الجنين على كرموزم إضافي أو افتقادها كروموسوماً واحداً.
- إصابة الجنين بتشوهات هيكلية، أي خلل وعيوب في دماغه أو قلبه أو عاشه الفقري أو أمعائه أو كلويته.
- إصابة الألم بالدّاء بالبطنيّ أو السيلياك، وهو نوع من أنواع الالتهابات الذي يُصيب الأمعاء الدقيقة جراء ردّ فعلٍ غير طبيعي إزاء بروتين الغلوتين الموجود بكثرة في العديد من الحبوب، ويؤثّر في عملية الاستقلاب ويحول دون امتصاص الجسم لعددٍ من المغذيات.
- فشل المشيمة بالانفرااس بالشكل الصحيح في جدار رحم الأم نتيجة انخفاض معدل البروجسترون في جسم هذه الأخيرة.
- تعرّض المشيمة لنزيفٍ حادٍ أو تدني مستوى هرمون اتش سي جي في جسم المرأة الحامل.
- عدم انتظام معدل السكري في جسم الأم وعدم اتباعها نظاماً غذائياً صحياً ومغذياً.
- إهمال الألم نظارتها الغذائي واستمرارها في بعض العادات السيئة كشرب السجائر واستهلاك مادة الكافيين بكميات كبيرة.
- وجود تكوين ليفي داخل عضلة رحم الأم أو إصابة رحم الأم وحوضها بتشوهات غالباً ما تكون نتيجة عمليات جراحية خضعت لها إثر نزيف حاد ألمّ بها في مرحلة ما بعد الولادة الأولى.